

Poliomielitis

Es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso provocando parálisis, que afecta principalmente a lactantes y niños/as menores de 5 años.

El virus se transmite de persona a persona a través de los alimentos o agua contaminada con materia fecal de una persona infectada con el virus.

Se puede prevenir por medio de la vacuna Salk:

- 1ra dosis ----- a los 2 meses
- 2da dosis ----- a los 4 meses
- 3ra dosis ----- a los 6 meses
- Refuerzo ----- a los 4-5 años



Vacunarse contra estas enfermedades es importante para:

- Cuidar la salud de los grupos más afectados
- Evitar la reintroducción de estos virus en el país
- Proteger a quienes no pueden recibir la vacuna por alguna situación

En cuanto a la polio, estamos muy cerca de su erradicación en el mundo.

Mientras exista la poliomielitis salvaje en cualquier país, todas las naciones seguirán estando en riesgo de importar el virus.

📍 Dónde vacunarse

Escaneá el QR
y conocé todos los
vacunatorios de la
provincia



Departamento de Inmunizaciones
Dirección de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles
Dirección General de Planificación Estratégica en Gestión de Salud.
Ministerio de Salud de Córdoba
Av. Vélez Sarsfield 2311 - Edificio Eva Perón
Ciudad Universitaria - Córdoba (C.P. 5000)

Ministerio de
SALUD



POLIO SARAMPIÓN RUBÉOLA



Tres enfermedades que
podemos prevenir con la
vacunación, para evitar
brotes y su reingreso al país.

Sarampión

Es una infección viral, eruptiva y febril altamente contagiosa, que se propaga rápidamente por el aire por medio de gotas de saliva al toser o estornudar.

Se presenta en formas más graves principalmente en niños y niñas menores de 5 años o con desnutrición y en personas adultas de más de 20 años.

En ocasiones, puede generar complicaciones graves en pulmones o en el cerebro, que pueden inclusive causar la muerte.

Síntomas

- Fiebre alta
- Erupción en la piel (manchas rojas)
- Secreción nasal
- Conjuntivitis
- Tos



Rubéola

Es una enfermedad viral que afecta frecuentemente a niños y niñas, y se cursa usualmente de manera leve. También se contagia a través de gotas de saliva al toser o estornudar.

Síntomas

- Erupción en la piel (manchas rojas)
- Fiebre
- Conjuntivitis
- Dolor de cabeza
- Inflamación de ganglios (alrededor de la nuca y detrás de las orejas)

Síndrome de Rubéola Congénita - SRC -

La rubéola es benigna en personas adultas, niños y niñas. Sin embargo, cuando una persona embarazada se expone al virus durante el primer trimestre, existe el riesgo de malformaciones en el feto, lo que puede ocasionar sordera, ceguera y cardiopatías. También puede provocar la muerte fetal.



El sarampión y la rubéola no tienen tratamientos específicos, pero se pueden prevenir con la vacunación.

• **TRIPLE VIRAL:** Colocar 1era dosis a los 12 meses de vida y 2da dosis a los 4-5 años (según cohorte de nacimiento).

• **DOBLE VIRAL O TRIPLE VIRAL:** para personas adultas, viajeros y personal de salud.

